

Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»	Vol. XLVIII	pp. 119–136	© 30 Dec. 2005
---	-------------	-------------	-------------------

## CHECKLIST OF CHRYSOMELIDAE (COLEOPTERA) OF ROMANIA

SANDA MAICAN

**Abstract.** The present paper gives the updated list of the Chrysomelidae from Romania, including 571 species in 82 genera belonging to 13 subfamilies. To them 30 species with uncertain status in Romanian fauna must be added, they being listed with special remarks. New recorded chrysomelid species from Romania will be added to this inventory in the future.

**Résumé.** Le travail présente la liste actualisée des Chrysomelidae de Roumanie, qui comprend 571 espèces, appartenant à 82 genres et 13 sous-familles. On doit y ajouter 30 espèces à statut incertain dans la faune de la Roumanie; elles sont présentées séparément avec des remarques spéciales. À l'avenir, d'autres espèces de Chrysomelidae de la Roumanie seront ajoutées à cet inventaire.

**Key words:** Chrysomelidae, Coleoptera, Romania, checklist.

The present list is elaborated basing on the results of my investigations, and also bibliographic studies. It is the first synthesis concerning leaf-beetles fauna in Romania. Older catalogues deal with the whole beetle fauna, referring to a single or to several neighbouring provinces: Transylvania – Bielz (1887), Seidlitz (1891), Petri (1912, 1925–1926); Transylvania, Maramureş, Banat and Crişana – Kuthy (1900); Wallahia, Moldavia and Dobroudja – Fleck (1905).

For realizing this inventory, it was necessary to:

- establish the synonyms;
- up-date the nomenclature;
- up-date the inclusion of species in supraspecific taxa according to recent bibliography.

A total of 13 subfamilies, 82 genera and 571 species are presented.

The subfamilies are listed in the presumed phyletic position, according to Seeño & Wilcox (1982) and the genera, subgenera and species in alphabetical order. The nomenclature and the systematics are given after Warchałowski (2003). The subspecies and the varieties are omitted. Listed synonyms mainly refer to the species mentioned in older papers under another name.

The chrysomelid fauna of Romania is characterized by the occurrence of the following endemic species:

*Aphthona valachica* Heikertinger – *terra typica*: Comana (Southern Romania);

*Chloropterus moldaviensis* Pic – *terra typica*: Bârlad Valley (Moldavia region); according to Warchałowski (2003), perhaps a geographic form of *Chloropterus versicolor* (Morawitz);

*Chrysolina obenbergeri* Bechyné – *terra typica*: Rodbav (Southern Carpathians); also recorded from the Turda Gorges (Kaszab, 1962); according to Warchałowski (2003), it may be a local form of *Chrysolina fimbrialis* (Küster);

*Chrysolina biharica* (Breit) – *terra typica*: Bihor; it may be conspecific with *Chrysolina menthae crassicollis* Suffrian (Warchałowski, 2003);

*Chrysolina weisei* (Frivaldszky) – mentioned only in Banat and Retezat Mountains (Southern Carpathians);

*Cryptocephalus motasi* Panin – species described based on a single specimen collected from the Andronache Forest (now destroyed), near Bucharest; the taxonomic status of this species need verification;

*Galeruca hunyadensis* Csiki – species described based on five specimens collected from „Romania, Surduc-Pass, Livezeni, Hunedoara county, leg. Csiki”;

*Pachybrachis carpathicus* (Rey) – an extremely rare and poorly studied species; in the collection from Paris there are six specimens: five labelled „Carpathes, Cruce-Moldav., leg. Montandon“ and one specimen labelled „Sinaia, Valachie, A. L. Montandon“ (Warchałowski, in litt.);

*Timarchida deubeli* Ganglbauer – *terra typica*: Bucegi Mountains (Southern Carpathians); mentioned also from Bihor, Gilău and Retezat Mountains, Cristianul Mare, Azuga.

### CHECKLIST

#### Family Chrysomelidae Latreille, 1802

##### Subfamily Donaciinae Kirby, 1837

##### *Donacia* Fabricius, 1775

##### *Donacia* s. str.

*Donacia crassipes* Fabricius, 1775

[= *Donacia micans* Hoppe, 1795]

##### *Donaciomima* Medvedev, 1973

*Donacia antiqua* Kunze, 1818

[= *Donacia gracilis* Suffrian, 1845]

*Donacia aquatica* (Linnaeus, 1758)

[= *Donacia dentipes* Fabricius, 1792]

*Donacia bicolora* Zschach, 1788

[= *Donacia sagittariae* Fabricius, 1792]

*Donacia brevicornis* Ahrens, 1810

*Donacia dentata* Hoppe, 1795

[= *Donacia angustata* Kunze, 1818]

*Donacia impressa* (Paykull, 1799)

*Donacia malinovskyi* Ahrens, 1810

*Donacia marginata* Hoppe, 1795

[= *Donacia limbata* Panzer, 1796]

*Donacia obscura* Gyllenhal, 1813

[= *Donacia splendens* Jacobson, 1925]

*Donacia semicuprea* Panzer, 1796

*Donacia simplex* Fabricius, 1775

[= *Donacia linearis* Hoppe, 1795]

*Donacia thalassina* Germar, 1811

*Donacia versicolore* (Brahm, 1790)

[= *Donacia bidens* Olivier, 1791]

*Donacia vulgaris* Zschach, 1788

[= *Donacia typhae* Ahrens, 1810]

##### *Donaciella* Reitter, 1920

*Donacia cinerea* (Herbst, 1784)

*Donacia clavipes* (Fabricius, 1793)

[= *Donacia menyanthidis* Gyllenhal,

1813]

*Donacia tomentosa* (Ahrens, 1810)

##### *Macroplea* Samouelle, 1819

*Macroplea appendiculata* (Panzer, 1794)

[= *Donacia equiseti* Fabricius, 1798]

*Macroplea mutica* (Fabricius, 1798)

##### *Plateumaris* Thomson, 1866

*Plateumaris braccata* (Scopoli, 1772)

*Plateumaris consimilis* (Schrank, 1781)

[= *Donacia rufipes* Olivier, 1791]

*Plateumaris rustica* (Kunze, 1818)

[= *Plateumaris affinis* Kunze, 1818]

*Plateumaris sericea* (Linnaeus, 1761)

[= *Plateumaris discolor* Panzer, 1795]

##### Subfamily Orsodacninae Thomson, 1866

##### *Orsodacne* Latreille, 1802

*Orsodacne cerasi* (Linnaeus, 1758)

[= *Crioceris chlorotica* Olivier, 1791]

*Orsodacne humeralis* Latreille, 1804

[= *Orsodacne lineola* Panzer, 1795]

##### Subfamily Zeugophorinae Chûjô, 1952

##### *Zeugophora* Kunze, 1818

*Zeugophora flavicollis* (Marsham, 1802)

*Zeugophora scutellaris* Suffrian, 1840

*Zeugophora subspinosa* (Fabricius, 1781)

*Zeugophora turneri* Power, 1863

[= *Zeugophora rufotestacea* Kraatz, 1871]

##### Subfamily Criocerinae Latreille, 1807

##### *Crioceris* Müller, 1764

*Crioceris asparagi* (Linnaeus, 1758)

*Crioceris duodecimpunctata* (Linnaeus,

1758)

*Crioceris quatuordecimpunctata* (Scopoli,

1763)

*Crioceris quinquepunctata* (Scopoli,

1763)

- Lema* Fabricius, 1798  
*Lema cyanella* (Linnaeus, 1758)  
 [= *Lema puncticollis* Curtis, 1830]
- Lilioceris* Reitter, 1912  
*Lilioceris lili* (Scopoli, 1763)  
*Lilioceris merdigera* (Linnaeus, 1758)  
 [= *Crioceris brunnea* Fabricius, 1792]
- Oulema* Gozis, 1886  
*Oulema erichsonii* (Suffrian, 1841)  
*Oulema gallaeciana* (Heyden, 1870)  
 [= *Chrysomela lichenis* Voet, 1806]  
*Oulema melanopus* (Linnaeus, 1758)  
*Oulema rufocyanea* (Suffrian, 1847)  
*Oulema septentrionis* (Weise, 1880)  
*Oulema tristis* (Herbst, 1786)  
 [= *Lema flavipes* Suffrian, 1841]
- Subfamily Clythrinae Kirby, 1837  
*Cheilotoma* Chevrolat, 1837  
*Cheilotoma erythrostoma* (Faldermann, 1837)  
*Cheilotoma musciformis* (Goeze, 1777)  
 [= *Chrysomela bucephala* Schaller, 1783]
- Clytra* Laicharting, 1781  
*Clytra* s. str.  
*Clytra laeviuscula* (Ratzeburg, 1837)  
*Clytra quadripunctata* (Linnaeus, 1758)  
 [= *Clytra appendicina* Lacordaire, 1848]
- Clytraria* Semenov, 1903  
*Clytra atraphaxidis* (Pallas, 1773)  
*Clytra novempunctata* Olivier, 1808  
*Clytra valeriana* (Ménétriés, 1832)
- Coptocephala* Chevrolat, 1837  
*Coptocephala* s. str.  
*Coptocephala chalybaea* (Germar, 1824)  
*Coptocephala gebleri* Gebler, 1841  
*Coptocephala rubicunda* (Laicharting, 1781)  
*Coptocephala scopolina* (Linnaeus, 1767)  
*Coptocephala unifasciata* (Scopoli, 1763)
- Labidostomis* Germar, 1822  
*Labidostomis* s. str.  
*Labidostomis cyanicornis* Germar, 1822  
*Labidostomis humeralis* (Schneider, 1792)  
*Labidostomis longimana* (Linnaeus, 1761)  
*Labidostomis lucida* (Germar, 1824)  
 [= *Clythra axillaris* Lacordaire, 1848]  
*Labidostomis pallidipennis* (Gebler, 1830)  
 [= *Labidostomis longipennis* Gebler, 1841]  
*Labidostomis propinqua* Faldermann, 1837  
*Labidostomis tridentata* (Linnaeus, 1758)
- Lachnaia* Chevrolat, 1837  
*Lachnaia* s. str.  
*Lachnaia sexpunctata* (Scopoli, 1763)
- Smaragdina* Chevrolat, 1837  
*Monrosia* Medvedev, 1971  
*Smaragdina affinis* (Illiger, 1794)  
*Smaragdina aurita* (Linnaeus, 1767)  
*Smaragdina diversipes* Letzner, 1839  
*Smaragdina flavicollis* Charpentier, 1825  
*Smaragdina graeca* (Lefèvre, 1872)  
*Smaragdina salicina* (Scopoli, 1763)  
 [= *Cryptocephalus cyaneus* Fabricius, 1775]  
*Smaragdina tibialis* (Brullé, 1832)  
*Smaragdina xanthaspis* (Germar, 1824)
- Smaragdina* s. str.  
*Smaragdina chloris* (Lacordaire, 1848)  
 [= *Calyptorhina biornata* Lefèvre, 1872]  
*Smaragdina concolor* (Fabricius, 1792)  
 [= *Clythra hypocrita* Lacordaire, 1848]  
*Smaragdina limbata* (Stéven, 1806)
- Tituboea* Lacordaire, 1848  
*Tituboea macropus* (Illiger, 1800)
- Subfamily Cryptocephalinae Gyllenhal, 1813  
 Tribe Cryptocephalini Gyllenhal, 1813  
*Cryptocephalus* Müller, 1764  
*Asionus* Lopatin, 1988  
*Cryptocephalus apicalis* Gebler, 1830  
*Cryptocephalus bohemi* Drapiez, 1819  
*Cryptocephalus flexuosus* Krynicki, 1834  
*Cryptocephalus gamma* H.-Schäffer, 1829  
*Cryptocephalus quatuordecimmaculatus* Schneider, 1792
- Burlinius* Lopatin, 1965  
*Cryptocephalus bilineatus* (Linnaeus, 1767)  
*Cryptocephalus carpathicus* Frivaldszky, 1883  
*Cryptocephalus chrysopus* (Gmelin, 1888)  
 [= *Cryptocephalus hübnéri* Fabricius, 1792]  
*Cryptocephalus connexus* Olivier, 1808  
*Cryptocephalus elegantulus* Gravenhorst, 1807  
*Cryptocephalus exiguus* Schneider, 1792  
*Cryptocephalus frontalis* Marsham, 1802  
*Cryptocephalus fulvus* Goeze, 1777  
 [= *Cryptocephalus signaticollis* Suffrian, 1848]  
*Cryptocephalus labiatus* (Linnaeus, 1761)  
*Cryptocephalus ocellatus* Drapiez, 1819  
 [= *Cryptocephalus geminus* Gyllenhal, 1827]  
*Cryptocephalus planifrons* Weise, 1882  
*Cryptocephalus populi* Suffrian, 1847  
*Cryptocephalus pusillus* Fabricius, 1777  
*Cryptocephalus pygmaeus* Fabricius, 1792  
 [= *Cryptocephalus vittula* Suffrian, 1848]  
*Cryptocephalus querceti* Suffrian, 1848  
*Cryptocephalus rufipes* (Goeze, 1777)

- [= *Cryptocephalus gracilis* Fabricius, 1792]  
*Cryptocephalus saliceti* Zebe, 1855  
*Cryptocephalus strigosus* Germar, 1824  
*Cryptocephalus* s. str.  
*Cryptocephalus androgynae* Marseul, 1875  
[= *Cryptocephalus coeruleascens* Sahlberg, 1839]  
*Cryptocephalus aureolus* Suffrian, 1847  
*Cryptocephalus bicolor* Eschscholtz, 1818  
[= *Cryptocephalus concinnus* Suffrian, 1853]  
*Cryptocephalus biguttatus* (Scopoli, 1763)  
*Cryptocephalus bipunctatus* (Linnaeus, 1758)  
[= *Cryptocephalus dispar* Paykull, 1799]  
*Cryptocephalus cordiger* (Linnaeus, 1758)  
*Cryptocephalus decemmaculatus* (Linnaeus, 1758)  
*Cryptocephalus distinguendus* Schneider, 1792  
*Cryptocephalus elongatus* Germar, 1824  
*Cryptocephalus flavipes* Fabricius, 1781  
*Cryptocephalus frenatus* Laicharting, 1781  
[= *Cryptocephalus trilineatus* Fabricius, 1798]  
*Cryptocephalus globicollis* Suffrian, 1847  
*Cryptocephalus hypochoeridis* (Linnaeus, 1758)  
[= *Cryptocephalus similis* Stephens, 1834]  
*Cryptocephalus imperialis* Laicharting, 1781  
*Cryptocephalus janthinus* Germar, 1824  
*Cryptocephalus laetus* Fabricius, 1792  
*Cryptocephalus marginatus* Fabricius, 1781  
*Cryptocephalus moraei* (Linnaeus, 1758)  
*Cryptocephalus motasi* Panin, 1941  
*Cryptocephalus nitidulus* Fabricius, 1787  
*Cryptocephalus nitidus* (Linnaeus, 1758)  
*Cryptocephalus octacosmus* Bedel, 1891  
[= *Cryptocephalus sexpustulatus* Rossi, 1790]  
*Cryptocephalus octomaculatus* Rossi, 1790  
*Cryptocephalus octopunctatus* (Scopoli, 1763)  
*Cryptocephalus parvulus* Müller, 1776  
*Cryptocephalus primarius* Harold, 1872  
[= *Cryptocephalus imperialis* Fabricius, 1798]  
*Cryptocephalus quadriguttatus* Richter, 1820  
*Cryptocephalus quadripustulatus* Gyllenhal, 1813
- Cryptocephalus quinquepunctatus* (Scopoli, 1763)  
*Cryptocephalus sericeus* (Linnaeus, 1758)  
*Cryptocephalus sexpunctatus* (Linnaeus, 1758)  
*Cryptocephalus signatifrons* Suffrian, 1847  
*Cryptocephalus solivagus* Leonardi & Sassi, 2001  
*Cryptocephalus transiens* Franz, 1949  
*Cryptocephalus trimaculatus* Rossi, 1790  
*Cryptocephalus turcicus* Suffrian, 1847  
*Cryptocephalus violaceus* Laicharting, 1781  
*Cryptocephalus virens* Suffrian, 1847  
*Cryptocephalus vittatus* Fabricius, 1775  
*Disopus* Stephens, 1839  
*Cryptocephalus pini* (Linnaeus, 1758)  
*Heterichnus Warchałowski*, 1991  
*Cryptocephalus coryli* (Linnaeus, 1758)  
[= *Cryptocephalus vitis* Fabricius, 1775]  
*Lamellosus* Tomov, 1979  
*Cryptocephalus laevicollis* Gebler, 1830  
*Protophysus* Chevrolat, 1837  
*Cryptocephalus schaefferi* Schrank, 1789  
[= *Cryptocephalus lobatus* Fabricius, 1792]  
*Cryptocephalus villosulus* Suffrian, 1847  
Tribe Pachybrachini Chapuis, 1874  
*Pachybrachis* Chevrolat, 1837  
*Pachybrachis* s. str.  
*Pachybrachis carpathicus* (Rey, 1883)  
*Pachybrachis fimbriolatus* (Suffrian, 1848)  
*Pachybrachis hieroglyphicus* (Laich., 1781)  
*Pachybrachis hippophaes* (Suffrian, 1848)  
*Pachybrachis limbatus* (Ménétriés, 1836)<sup>1</sup>  
*Pachybrachis picus* (Weise, 1882)<sup>2</sup>  
*Pachybrachis scriptidorsum* Marseul, 1875  
*Pachybrachis sinuatus* (Mulsant & Rey, 1859)  
[= *Pachybrachis haliciensis* Miller, 1868]  
*Pachybrachis tessellatus* (Olivier, 1791)  
Tribe Stylosomini Chapuis, 1874  
*Stylosomus* Suffrian, 1848  
*Stylosomus* s. str.  
*Stylosomus flavus* Marseul, 1875  
*Stylosomus tamaricis* (H.-Schäffer, 1838)

<sup>1</sup> The only record of this species in the Romanian fauna is that of Bielz (op. cit.) who mentions this species from Sibiu.

<sup>2</sup> Recorded under the name *Pachybrachis histrio* in „Fauna Transsylvanica“ (Seidlitz, op. cit.), without indications of locality; Petri (1912) mentions the species again on the base of Seidlitz's paper.

- Subfamily Lamprosomatinae Gemminger, 1874  
*Oomorplus* Curtis, 1831  
*Oomorplus concolor* (Sturm, 1807)  
 [= *Lamprosoma kolbei* Scholz, 1926]
- Subfamily Eumolpinae Thomson, 1859  
 Tribe Adoxini Jacoby, 1908  
*Bromius* Chevrolat, 1837  
*Bromius obscurus* (Linnaeus, 1758)  
*Macrocoma* Chapuis, 1874  
*Macrocoma rubripes* (Schaufuss, 1862)  
*Pachnephorus* Redtenbacher, 1845  
*Pachnephorus pilosus* (Rossi, 1790)  
*Pachnephorus tessellatus* (Duftschmidt, 1825)  
*Pachnephorus villosus* (Duftschmidt, 1825)  
 Tribe Eumolpini Jacoby, 1908  
*Eumolpus* Illiger, 1798  
*Eumolpus asclepiadeus* (Pallas, 1776)  
*Pales* Redtenbacher, 1858  
*Pales ulema* (Germar, 1813)  
 Tribe Nodinini Chen, 1940  
*Chloropterus* Morawitz, 1861  
*Chloropterus moldaviensis* Pic, 1909
- Subfamily Chrysomelinae Latreille, 1802  
 Tribe Chrysomelini Latreille, 1802  
*Chrysolina* Motschulsky, 1860  
 [= *Chrysomela* auctorum non Linnaeus, 1758]  
*Anopachis* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina aurichalcea* (Mannerheim, 1825)  
*Chrysolina eurina* (Frivaldszki, 1883)  
 [= *Chrysomela perplexa* Breit, 1920]  
*Chalcoidea* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina carnifex* (Fabricius, 1792)  
*Chrysolina marginata* (Linnaeus, 1758)  
*Chrysolina* s. str.  
*Chrysolina staphylaea* (Linnaeus, 1758)  
*Chrysomorpha* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina cerealis* (Linnaeus, 1767)  
*Colaphodes* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina haemoptera* (Linnaeus, 1758)  
*Colaphoptera* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina biharica* (Breit, 1919)  
*Chrysolina globosa* (Panzer, 1805)  
*Chrysolina hemisphaerica* (Germar, 1817)  
*Chrysolina marcasitica* (Germar, 1824)  
 [= *Chrysomela distincta* Küster, 1844]  
*Chrysolina menthae* (Schrank, 1776)  
 [= *Chrysolina rufa* Duftschmidt, 1825]  
*Chrysolina umbratilis* (Weise, 1887)  
 [= *Chrysomela olivacea* Suffrian, 1851]  
*Colaphosoma* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina sturmi* (Westhoff, 1882)  
 [= *Chrysomela diversipes* Bedel, 1892]
- Craspeda* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina limbata* (Fabricius, 1775)  
*Erythrochrysa* Bechyné, 1950  
*Chrysolina polita* (Linnaeus, 1758)  
*Euchrysolina* Bechyné, 1950  
*Chrysolina graminis* (Linnaeus, 1758)  
 [= *Chrysomela fulgida* Fabricius, 1801]  
*Fastuolina* Warchałowski, 1991  
*Chrysolina fastuosa* (Scopoli, 1763)  
 [= *Chrysomela speciosa* Linnaeus, 1767]  
*Heliostola* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina carpathica* (Fuss, 1856)  
*Chrysolina lichenis* (Richter, 1820)  
*Hypericia* Bedel, 1892  
*Chrysolina brunsvicensis* (Gravenhorst, 1807)  
 [= *Chrysolina duplicata* Zenker, 1815]  
*Chrysolina geminata* (Paykull, 1799)  
*Chrysolina hyperici* (Forster, 1771)  
*Chrysolina quadrigemina* (Suffrian, 1851)  
*Ovosoma* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina atrovirens* Frivaldszky, 1876<sup>3</sup>  
*Chrysolina susterai* Bechyné, 1950  
 [= *Chrysomela morio* Krynicki, 1832]  
*Chrysolina vernalis* (Brullé, 1832)  
*Ovostoma* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina globipennis* (Suffrian, 1851)  
*Chrysolina olivieri* (Bedel, 1892)  
 [= *Chrysomela coerulea* Olivier, 1807]  
*Sphaeromela* Bedel, 1892  
*Chrysolina varians* (Schaller, 1783)  
*Stichoptera* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina gypsophilae* (Küster, 1845)  
*Chrysolina rossia* (Illiger, 1802)  
 [= *Chrysomela carnifex* Panzer, 1794]  
*Chrysolina sanguinolenta* (Linnaeus, 1758)  
 [= *Chrysolina marginalis* Duftschmidt, 1825]
- Sulcicollis* Sahlberg, 1913  
*Chrysolina chalcites* (Germar, 1824)  
*Chrysolina oricalcia* (Müller, 1776)  
 [= *Chrysomela lamina* Fabricius, 1792]  
*Synergia* Weise, 1900  
*Chrysolina coeruleans* (Scriba, 1791)  
 [= *Chrysomela violacea* Panzer, 1797]  
*Chrysolina herbacea* (Duftschmidt, 1825)

<sup>3</sup> Species described from the Southern Carpathians; it includes two subspecies: *atrovirens* from the Carpathians and *minckwitzii* Apfelbeck distributed in the Balkans.  
*Taeniosticha* Motschulsky, 1860

- Chrysolina reitteri* (Weise, 1884)  
 [= *Chrysomela lurida* Linnaeus, 1767]  
*Threnosoma* Motschulsky, 1860  
*Chrysolina cribrata* (Ahrens, 1812)  
*Chrysolina fimbrialis* (Küster, 1845)  
*Chrysolina obenbergeri* Bechyně, 1950  
*Chrysolina weisei* (Frivaldszky, 1883)  
*Chrysomela* Linnaeus, 1758  
*Chrysomela* s. str.  
*Chrysomela populi* Linnaeus, 1758  
*Chrysomela saliceti* Suffrian, 1849  
*Chrysomela tremula* Fabricius, 1787  
*Pachylina* Medvedev, 1989  
*Chrysomela collaris* Linnaeus, 1758  
*Strickerus* Lucas, 1920  
*Chrysomela cuprea* Fabricius, 1775  
*Chrysomela vigintipunctata* (Scopoli, 1763)  
*Colaphus* Dahl, 1823  
*Colaphus sophiae* (Schaller, 1783)  
*Entomoscelis* Chevrolat, 1837  
*Entomoscelis adonidis* (Pallas, 1771)  
*Entomoscelis suturalis* Weise, 1882  
*Gastrophysa* Chevrolat, 1837  
*Gastrophysa* s. str.  
*Gastrophysa polygoni* (Linnaeus, 1758)  
*Gastrophysa viridula* (De Geer, 1775)  
 [= *Chrysomela raphani* Herbst, 1783]  
*Gonioctena* Chevrolat, 1837  
*Gonioctena* s. str.  
*Gonioctena decemnotata* (Marsham, 1802)  
*Gonioctena flavicornis* (Suffrian, 1851)  
*Gonioctena linnaeana* (Schrank, 1781)  
 [= *Chrysomela triandrae* Suffrian, 1851]  
*Gonioctena viminalis* (Linnaeus, 1758)  
*Goniomena* Motschulsky, 1860  
*Gonioctena intermedia* (Helliesen, 1913)  
*Gonioctena interposita* (Franz & Palmén, 1950)  
*Gonioctena pallida* (Linnaeus, 1758)  
 [= *Chrysomela dispar* Paykull, 1799]  
*Gonioctena quinquepunctata* (Fabricius, 1787)  
*Spartomena* Reitter, 1912  
*Gonioctena fornicata* (Brüggemann, 1873)  
*Spartophila* Chevrolat, 1837  
*Gonioctena olivacea* (Forster, 1771)  
 [= *Chrysomela litura* Fabricius, 1775]  
*Hydrothassa* Thomson, 1866  
*Agrostithassa* Jacobson, 1921  
*Hydrothassa glabra* (Herbst, 1783)  
 [= *Chrysomela aucta* Fabricius, 1787]
- Hydrothassa* s. str.  
*Hydrothassa hannoveriana* (Fabricius, 1775)  
*Hydrothassa marginella* (Linnaeus, 1758)  
*Leptinotarsa* Chevrolat, 1837  
*Leptinotarsa decemlineata* (Say, 1824)  
*Linaeidea* Motschulsky, 1860  
*Linaeidea aenea* (Linnaeus, 1758)  
*Oreina* Chevrolat, 1837  
*Allorina* Weise, 1902  
*Oreina coerulea* (Olivier, 1790)  
 [= *Chrysomela rugulosa* Suffrian, 1851]  
*Chrysochloa* Hope, 1840  
*Oreina cacaliae* (Schrank, 1785)  
*Oreina speciosissima* (Scopoli, 1763)  
*Intricatorina* Kühnelt, 1984  
*Oreina intricata* (Germar, 1824)  
*Oreina* s. str.  
*Oreina alpestris* (Schumell, 1844)  
*Oreina bifrons* (Fabricius, 1792)  
*Oreina gloriosa* (Fabricius, 1781)  
*Oreina speciosa* (Fabricius, 1781)  
*Oreina viridis* (Duftschmidt, 1825)  
*Protorina* Weise, 1894  
*Oreina plagiata* (Suffrian, 1861)  
 [= *Oreina commutata* Suffrian, 1861]  
*Virgulatorina* Kühnelt, 1984  
*Oreina virgulata* (Germar, 1824)  
*Phaedon* Latreille, 1829  
*Phaedon* s. str.  
*Phaedon armoraciae* (Linnaeus, 1758)  
 [= *Phaedon veronicae* Bedel, 1892]  
*Phaedon cochleariae* (Fabricius, 1792)  
 [= *Chrysomela grammica* Suffrian, 1851]  
*Phaedon concinnus* Stephens, 1831  
*Phaedon laevigatus* (Duftschmidt, 1825)  
*Neophaedon* Jacobson, 1901  
*Phaedon pyritus* (Rossi, 1792)  
 [= *Chrysomela grammicola* Drapiez, 1819]  
*Sternoplatys* Motschulsky, 1860  
*Phaedon segnis* Weise, 1884  
*Phratora* Chevrolat, 1837  
*Chaetoceroides* Strand, 1935  
*Phratora vulgatissima* (Linnaeus, 1758)  
*Phratora* s. str.  
*Phratora atrovirens* (Cornelius, 1857)  
*Phratora laticollis* (Suffrian, 1851)  
*Phratora tibialis* (Suffrian, 1851)  
 [= *Phyllodecta viennensis* Weise, 1882]  
*Phratora vitellinae* (Linnaeus, 1758)  
 [= *Phyllodecta angusticollis* Motsch., 1860]  
*Plagiodera* Chevrolat, 1837  
*Plagiodera versicolora* (Laicharting, 1781)

- Prasocuris* Latreille, 1802  
*Prasocuris junci* (Brahm, 1790)  
*Prasocuris phellandrii* (Linnaeus, 1758)
- Sclerophaedon* Weise, 1882  
*Sclerophaedon carniolicus* (Germar, 1824)  
 [= *Phaedon transsylvanicus* Fuss, 1861]  
*Sclerophaedon carpathicus* (Weise, 1875)  
*Sclerophaedon orbicularis* (Suffrian, 1851)
- Timarchida* Ganglbauer, 1897  
*Timarchida deubeli* Ganglbauer, 1897  
 [= *Timarchida flecki* Reitter, 1912]
- Tribe Timarchini Reitter, 1912
- Timarcha* Latreille, 1829  
*Metallotimarcha* Motschulsky, 1860  
*Timarcha corinthia* Fairmaire, 1873  
*Timarcha gibba* (Hagenbach, 1825)  
*Timarcha metallica* (Laicharting, 1781)
- Timarcha* s. str.  
*Timarcha rugulosa* Herrich-Schäffer, 1838  
*Timarcha tenebricosa* (Fabricius, 1775)
- Timarchostoma* Motschulsky, 1860  
*Timarcha goettingensis* (Linnaeus, 1758)  
 [= *Chrysomela coriaria* Laicharting, 1781]  
*Timarcha montana* Fairmaire, 1873  
*Timarcha pratensis* (Duftschmidt, 1825)  
 [= *Chrysomela coriaria* Olivier, 1807]
- Subfamily Galerucinae Latreille, 1802
- Tribe Agelastini Chapuis, 1875
- Agelastica* Chevrolat, 1837  
*Agelastica alni* (Linnaeus, 1758)  
 [= *Adimonia violacea* Laicharting, 1781]
- Tribe Galerucini Latreille, 1802
- Galeruca* Müller, 1764  
*Emarhopa* Weise, 1886  
*Galeruca rufa* Germar, 1824
- Galeruca* s. str.  
*Galeruca dahli* (Joannis, 1866)  
*Galeruca hunyadensis* Csiki, 1952  
*Galeruca interrupta* (Illiger, 1802)  
 [= *Adimonia hungarica* Frivaldszky, 1876]  
*Galeruca pomonae* (Scopoli, 1763)  
 [= *Chrysomela rustica* Schaller, 1883]  
*Galeruca tanacetii* (Linnaeus, 1758)
- Haptoscelis* Weise, 1886  
*Galeruca melanocephala* (Ponza, 1805)
- Galerucella* Crotch, 1873
- Galerucella* s. str.  
*Galerucella grisescens* (Joannis, 1866)  
*Galerucella nymphaeae* (Linnaeus, 1758)
- Neogalerucella* Chûjô, 1962
- Galerucella calmariensis* (Linnaeus, 1767)  
*Galerucella lineola* (Fabricius, 1781)  
 [= *Adimonia verna* Laicharting, 1781]  
*Galerucella pusilla* (Duftschmidt, 1825)  
*Galerucella tenella* (Linnaeus, 1761)  
 [= *Chrysomela parva* Herbst, 1783]
- Lochmaea* Weise, 1883  
*Lochmaea caprea* (Linnaeus, 1758)  
*Lochmaea crataegi* (Forster, 1771)  
*Lochmaea suturalis* (Thomson, 1866)
- Pyrrhalta* Joannis, 1866  
*Pyrrhalta viburni* (Paykull, 1799)
- Xanthogaleruca* Laboissière, 1934  
*Xanthogaleruca luteola* (Müller, 1766)
- Tribe Luperini Chapuis, 1875
- Calomicrus* Stephens, 1831  
*Calomicrus circumfusus* (Marsham, 1802)  
 [= *Luperus nigrofasciatus* Weise, 1886]  
*Calomicrus pinicola* (Duftschmidt, 1825)
- Diabrotica* Chevrolat, 1837  
*Diabrotica virgifera* Le Conte, 1858
- Euluperus* Weise, 1886  
*Euluperus cyaneus* (Joannis, 1866)  
*Euluperus major* (Weise, 1886)  
*Euluperus xanthopus* (Duftschmidt, 1825)
- Luperus* Geoffroy, 1762  
*Luperus cyanipennis* Küster, 1848  
*Luperus flavipes* (Linnaeus, 1767)  
 [= *Luperus carniolicus* Kiesenwetter, 1861]  
*Luperus longicornis* (Fabricius, 1781)  
*Luperus luperus* (Sulzer, 1776)  
 [= *Luperus niger* Goeze, 1777]  
*Luperus viridipennis* Germar, 1824  
*Luperus xanthopoda* (Schrank, 1781)  
 [= *Luperus rugifrons* Weise, 1895]
- Phyllobrotica* Chevrolat, 1837  
*Phyllobrotica adusta* (Creutzer, 1799)  
*Phyllobrotica quadrimaculata* (Linnaeus, 1758)
- Subfamily Halticinae Newman, 1834
- Altica* Müller, 1764  
*Altica brevicollis* Foudras, 1860  
*Altica carduorum* (Guérin-Méneville, 1858)  
*Altica fruticola* (Weise, 1888)  
*Altica helianthemii* (Allard, 1859)  
 [= *Haltica pusilla* Duftschmidt, 1825]  
*Altica impressicollis* (Reiche, 1862)  
 [= *Haltica lacunosa* Weise, 1900]  
*Altica lythri* Aubé, 1843  
*Altica oleracea* (Linnaeus, 1758)  
*Altica quercetorum* Foudras, 1860  
 [= *Haltica saliceti* Weise, 1888]  
*Altica tamaricis* Schrank, 1785

- Aphthona* Chevrolat, 1837  
*Aphthona abdominalis* (Duftschmidt, 1825)  
*Aphthona aeneomicans* Allard, 1875  
*Aphthona atrocaerulea* (Stephens, 1831)  
*Aphthona atrovirens* (Förster, 1849)  
*Aphthona cyparissiae* (Koch, 1803)  
*Aphthona czwalinae* Weise, 1888  
*Aphthona delicatula* Foudras, 1860  
*Aphthona euphorbiae* (Schrank, 1781)  
[= *Aphthona atratula* Allard, 1859]  
*Aphthona flava* Guillebeau, 1895  
*Aphthona flaviceps* Allard, 1859  
*Aphthona franzi* Heikertinger, 1944  
*Aphthona gracilis* Faldermann, 1837  
*Aphthona herbigrada* (Curtis, 1837)  
*Aphthona lacertosa* (Rosenhauer, 1847)  
*Aphthona lutescens* (Gyllenhal, 1813)  
*Aphthona nigriceps* (Redtenbacher, 1842)  
*Aphthona nigriscutis* Foudras, 1861  
*Aphthona nonstriata* (Goeze, 1777)  
[= *Altica coerulea* Geoffroy, 1785]  
*Aphthona ovata* Foudras, 1861  
*Aphthona pallida* (Bach, 1856)  
*Aphthona placida* (Kutschera, 1864)  
*Aphthona pygmaea* (Kutschera, 1861)  
[= *Haltica nigella* Kutschera, 1861]  
*Aphthona semicyanea* Allard, 1859  
[= *Aphthona viridula* Allard, 1866]  
*Aphthona stussineri* Weise, 1888  
[= *Aphthona pyrenaea* Heikertinger, 1944]  
*Aphthona valachica* Heikertinger, 1944  
*Aphthona venustula* (Kutschera, 1861)  
*Aphthona violacea* (Koch, 1803)
- Apteropoda* Stephens, 1839  
*Apteropoda globosa* (Illiger, 1794)  
*Apteropoda orbiculata* (Marsham, 1802)  
*Apteropoda splendida* Allard, 1860
- Argopus* Fischer, 1824  
*Argopus ahrensi* (Germar, 1817)  
*Argopus bicolor* Fischer, 1824
- Batophila* Foudras, 1860  
*Batophila fallax* Weise, 1888  
*Batophila moesica* Heikertinger, 1948  
*Batophila rubi* (Paykull, 1799)
- Chaetocnema* Stephens, 1831  
*Chaetocnema* s. str.  
*Chaetocnema aerosa* (Letzner, 1846)  
*Chaetocnema arenacea* (Allard, 1860)  
*Chaetocnema arida* Foudras, 1860  
*Chaetocnema aridula* (Gyllenhal, 1827)  
*Chaetocnema compressa* (Letzner, 1847)  
*Chaetocnema confusa* (Boheman, 1851)  
*Chaetocnema hortensis* (Geoffroy, 1785)
- Chaetocnema mannerheimi* (Gyllenhal, 1827)  
*Chaetocnema montenegrina* Heikertinger, 1912  
*Chaetocnema obesa* (Boieldieu, 1859)  
[= *Chaetocnema meridionalis* Foudras, 1860]  
*Chaetocnema sahlbergii* (Gyllenhal, 1827)  
*Chaetocnema subcoerulea* (Kutschera, 1864)  
[= *Chaetocnema punctulata* Mulsant, 1874]
- Tlanoma* Motschulsky, 1845  
*Chaetocnema breviscula* (Faldermann, 1837)  
*Chaetocnema chlorophana* (Duft., 1825)  
*Chaetocnema concinna* (Marsham, 1802)  
[= *Haltica dentipes* Koch, 1803]  
*Chaetocnema conducta* (Motschulsky, 1838)  
[= *Chaetocnema ahngeri* Jacobson, 1901]  
*Chaetocnema coyei* (Allard, 1863)  
*Chaetocnema laevicollis* (Thomson, 1866)  
[= *Chaetocnema heikertingeri* Ljubishtshev, 1963]  
*Chaetocnema major* (Duval, 1852)  
*Chaetocnema orientalis* (Bauduér, 1874)  
*Chaetocnema scheffleri* (Kutschera, 1864)  
*Chaetocnema semicoerulea* (Koch, 1803)  
*Chaetocnema tibialis* (Illiger, 1807)
- Crepidodera* Chevrolat, 1837  
*Crepidodera aurata* (Marsham, 1802)  
[= *Haltica versicolor* Kutschera, 1860]  
*Crepidodera aurea* (Geoffroy, 1785)  
[= *Chrysomela cyanea* Marsham, 1802]  
*Crepidodera fulvicornis* (Fabricius, 1792)  
*Crepidodera lamina* (Bedel, 1901)  
*Crepidodera nigricoxis* Allard, 1878  
*Crepidodera nitidula* (Linnaeus, 1758)  
*Crepidodera plutus* (Latreille, 1804)  
[= *Chalcoides chloris* Foudras, 1860]
- Derocrepis* Weise, 1886  
*Aeschrocnemis* Weise, 1888  
*Derocrepis serbica* (Kutschera, 1860)  
*Derocrepis* s. str.  
*Derocrepis rufipes* (Linnaeus, 1758)
- Dibolia* Latreille, 1829  
*Dibolia carpathica* Weise, 1893  
[= *Dibolia transcaucasica* Khnzorian, 1968]  
*Dibolia cryptocephala* (Koch, 1803)  
*Dibolia cynoglossi* (Koch, 1803)  
[= *Dibolia marrubii* Hering, 1924]  
*Dibolia depressiuscula* Letzner, 1846  
[= *Dibolia laevicollis* Foudras, 1860]

- Dibolia femoralis* Redtenbacher, 1849  
 [= *Dibolia aurichalcea* Förster, 1849]  
*Dibolia foersteri* Bach, 1859  
*Dibolia occultans* (Koch, 1803)  
*Dibolia phoenicia* Allard, 1866  
 [= *Dibolia orientalis* Weise, 1893]  
*Dibolia rugulosa* Redtenbacher, 1848  
*Dibolia schillingi* (Letzner, 1847)  
 [= *Dibolia punctillata* Foudras, 1860]  
*Dibolia timida* (Illiger, 1807)  
 [= *Dibolia eryngii* Bach, 1859]  
*Epitrix* Foudras, 1859  
*Epitrix abellei* (Bauduér, 1874)  
*Epitrix atropae* Foudras, 1860  
*Epitrix intermedia* Foudras, 1860  
*Epitrix pubescens* (Koch, 1803)  
*Hermaeophaga* Foudras, 1859  
*Hermaeophaga mercurialis* (Fabricius, 1792)  
*Hippuriphila* Foudras, 1859  
*Hippuriphila modeeri* (Linnaeus, 1761)  
*Longitarsus* Berthold, 1827  
*Longitarsus absynthii* Kutschera, 1862  
*Longitarsus aeneicollis* (Faldermann, 1837)  
 [= *Longitarsus suturalis* auctorum]  
*Longitarsus albineus* (Foudras, 1860)  
*Longitarsus apicalis* (Beck, 1817)  
 [= *Haltica praticola* Sahlberg, 1834]  
*Longitarsus atricillus* (Linnaeus, 1761)  
*Longitarsus ballotae* (Marsham, 1802)  
*Longitarsus brisouti* Heikertinger, 1912  
*Longitarsus brunneus* (Duftschmidt, 1825)  
 [= *Haltica castanea* Duftschmidt, 1825]  
*Longitarsus cerinthes* (Schrank, 1798)  
 [= *Longitarsus nervosus* Wollaston, 1854]  
*Longitarsus curtus* (Allard, 1860)  
*Longitarsus dimidiatus* (Allard, 1866)  
 [= *Longitarsus nitens* Khnzorian, 1968]  
*Longitarsus echii* (Koch, 1803)  
 [= *Haltica tibialis* Duftschmidt, 1825]  
*Longitarsus exsoletus* Linnaeus, 1758  
*Longitarsus ferrugineus* (Foudras, 1860)  
 [= *Longitarsus waterhousei* Kutschera,  
 1864]  
*Longitarsus foudrasi* Weise, 1893  
*Longitarsus fulgens* (Foudras, 1860)  
*Longitarsus ganglbaueri* Heikertinger,  
 1912  
*Longitarsus holsaticus* (Linnaeus, 1758)  
*Longitarsus jacobaeae* (Waterhouse, 1861)  
*Longitarsus juncicola* (Foudras, 1860)  
*Longitarsus kutscherae* (Rye, 1872)  
*Longitarsus languidus* Kutschera, 1863  
*Longitarsus lateripunctatus* Rosenhauer,  
 1856  
*Longitarsus lewisii* (Baly, 1874)  
*Longitarsus linnaei* (Duftschmidt, 1825)  
*Longitarsus longipennis* (Kutschera, 1863)  
*Longitarsus longiseta* Weise, 1888  
*Longitarsus luridus* (Scopoli, 1763)  
 [= *Haltica quadrisignata* Duftschmidt, 1825]  
*Longitarsus lycopi* (Foudras, 1860)  
 [= *Longitarsus seriatus* Kutschera, 1863]  
*Longitarsus medvedevi* Shapiro, 1956  
*Longitarsus melanocephalus* (De Geer,  
 1775)  
 [= *Longitarsus piciceps* Stephens, 1831]  
*Longitarsus membranaceus* (Foudras, 1860)  
*Longitarsus minimus* Kutschera, 1863  
*Longitarsus minusculus* (Foudras, 1860)  
*Longitarsus nanus* (Foudras, 1860)  
*Longitarsus nasturtii* (Fabricius, 1792)  
*Longitarsus niger* (Koch, 1803)  
 [= *Longitarsus elongatus* Bach, 1859]  
*Longitarsus nigerrimus* (Gyllenhal, 1827)  
*Longitarsus nigrofasciatus* (Goeze, 1777)  
 [= *Haltica lateralis* Illiger, 1807]  
*Longitarsus noricus* Leonardi, 1976  
*Longitarsus obliteratedus* (Rosenhauer, 1847)  
 [= *Longitarsus consociatus* Förster, 1849]  
*Longitarsus ochroleucus* (Marsham, 1802)  
 [= *Longitarsus cognatus* Wollaston, 1860]  
*Longitarsus pallidicornis* Kutschera, 1863  
 [= *Longitarsus hubenthalii* Wanka, 1917]  
*Longitarsus parvulus* (Paykull, 1799)  
*Longitarsus pellucidus* (Foudras, 1860)  
 [= *Longitarsus ionius* Mohr, 1962]  
*Longitarsus picicollis* Weise, 1900  
*Longitarsus pratensis* (Panzer, 1794)  
 [= *Haltica pusilla* Gyllenhal, 1813]  
*Longitarsus pulmonariae* Weise, 1893  
*Longitarsus quadriguttatus* (Pontoppidan,  
 1763)  
*Longitarsus reichei* (Allard, 1860)  
*Longitarsus rubellus* (Foudras, 1860)  
 [= *Longitarsus gravidulus* Kutschera, 1863]  
*Longitarsus rubiginosus* (Foudras, 1860)  
*Longitarsus salviae* Gruev, 1975  
*Longitarsus scutellaris* (Mulsant & Rey,  
 1874)  
*Longitarsus substriatus* Kutschera, 1863  
*Longitarsus succineus* (Foudras, 1860)  
*Longitarsus suturellus* (Duftschmidt, 1825)

- Longitarsus symphyti* Heikertinger, 1912  
*Longitarsus tabidus* (Fabricius, 1775)  
 [= *Altica verbasci* Panzer, 1794]  
*Longitarsus tristis* Weise, 1888  
 [= *Longitarsus pannonicus* Kaszab, 1962]  
*Testergus* Weise, 1893  
*Longitarsus anchlussae* (Paykull, 1799)  
*Longitarsus bulgaricus* Gruev, 1973  
*Longitarsus fuscoaeneus* Redtenbacher,  
 1849  
*Longitarsus pinguis* Weise, 1888  
*Lythraria* Bedel, 1897  
*Lythraria salicariae* (Paykull, 1800)  
*Mantura* Stephens, 1831  
*Mantura* s. str.  
*Mantura chrysanthemi* (Koch, 1803)  
*Mantura obtusata* (Gyllenhal, 1813)  
*Mantura rustica* (Linnaeus, 1767)  
*Minota* Kutschera, 1859  
*Minota* s. str.  
*Minota carpathica* Heikertinger, 1911  
*Minota halmae* (Apfelbeck, 1906)  
*Mniophila* Stephens, 1831  
*Mniophila muscorum* (Koch, 1803)  
*Neocrepidodera* Heikertinger, 1911  
 [= *Asioreestia* Jacobson, 1926]  
*Neocrepidodera corpulenta* (Kutschera,  
 1860)  
*Neocrepidodera crassicornis* Faldermann,  
 1837)  
*Neocrepidodera cyanescens* (Duft., 1825)  
*Neocrepidodera cyanipennis* (Kutsch.,  
 1860)  
*Neocrepidodera femorata* (Gyllenhal, 1813)  
 [= *Haltica femoralis* Duftschmidt, 1825]  
*Neocrepidodera ferruginea* (Scopoli, 1763)  
 [= *Haltica similis* Stephens, 1831]  
*Neocrepidodera impressa* (Fabricius, 1801)  
 [= *Crepidodera rufa* Küster, 1848]  
*Neocrepidodera melanostoma*  
 (Redtenbacher, 1849)  
*Neocrepidodera nigrifulva* (Gyllenhal,  
 1813)  
*Neocrepidodera norica* (Weise, 1890)  
*Neocrepidodera puncticollis* (Reitter, 1880)  
 [= *Crepidodera picea* Petri, 1907]  
*Neocrepidodera transsilvanica* (Fuss, 1864)  
*Neocrepidodera transversa* (Marsham,  
 1802)  
*Orestia* Germar, 1845  
*Orestia alpina* (Germar, 1824)<sup>4</sup>  
<sup>4</sup> The specimens from Romania belong to *ab. hungarica* Heikertinger, distributed in Banat and Macedonia (Gruev et. al, 1993).
- Orestia aubei* Allard, 1859  
 [= *Haltica arcuata* Miller, 1868]  
*Orestia carpathica* Reitter, 1880  
*Orestia paveli* (Frivaldszky, 1877)  
*Phyllotreta* Chevrolat, 1837  
*Phyllotreta armoraciae* (Koch, 1803)  
*Phyllotreta astrachanica* Lopatin, 1977  
*Phyllotreta atra* (Fabricius, 1775)  
*Phyllotreta austriaca* Heikertinger, 1909  
*Phyllotreta balcanica* Heikertinger, 1909  
*Phyllotreta christinae* Heikertinger, 1941  
*Phyllotreta cruciferae* (Goeze, 1777)  
 [= *Altica poeciloceras* Comolli, 1837]  
*Phyllotreta dacica* Heikertinger, 1941  
*Phyllotreta diademata* Foudras, 1860  
*Phyllotreta dilatata* Thomson, 1866  
*Phyllotreta erysimi* Weise, 1900  
*Phyllotreta exclamationis* (Thunberg, 1784)  
*Phyllotreta flexuosa* (Illiger, 1794)  
*Phyllotreta ganglbaueri* Heikertinger, 1909  
*Phyllotreta nemorum* (Linnaeus, 1758)  
*Phyllotreta nigripes* (Fabricius, 1775)  
 [= *Haltica lepidii* Koch, 1803]  
*Phyllotreta nodicornis* (Marsham, 1802)  
 [= *Haltica antennata* Koch, 1803]  
*Phyllotreta ochripes* (Curtis, 1837)  
 [= *Haltica excisa* Redtenbacher, 1849]  
*Phyllotreta procera* (Redtenbacher, 1849)  
*Phyllotreta punctulata* (Marsham, 1802)  
 [= *Phyllotreta aerea* Allard, 1859]  
*Phyllotreta striolata* (Fabricius, 1803)  
 [= *Phyllotreta vittata* auctorum]  
*Phyllotreta tetrastigma* (Comolli, 1837)  
*Phyllotreta undulata* (Kutschera, 1860)  
*Phyllotreta vittula* (Redtenbacher, 1849)  
*Podagrica* Chevrolat, 1837  
*Podagrica fuscicornis* (Linnaeus, 1766)  
 [= *Crioceris fulvipes* Fabricius, 1801]  
*Podagrica fuscipes* (Fabricius, 1775)  
 [= *Chrysomela bicolor* Goeze, 1777]  
*Podagrica malvae* (Illiger, 1807)  
*Podagrica menetriesii* (Faldermann, 1837)  
 [= *Podagrica rudicollis* Foudras, 1860]  
*Psylliodes* Berthold, 1827  
*Psylliodes* s. str.  
*Psylliodes aereus* Foudras, 1860  
*Psylliodes affinis* (Paykull, 1799)  
*Psylliodes attenuatus* (Koch, 1803)  
*Psylliodes brisouti* Bedel, 1898

- Psylliodes chalcomerus* (Illiger, 1807)  
*Psylliodes chrysocephalus* (Linnaeus, 1758)  
 [= *Psylliodes cyanopterus* Illiger, 1807]  
*Psylliodes circumdatus* (Redtenbacher, 1842)  
*Psylliodes cucullatus* (Illiger, 1807)  
*Psylliodes cupreus* (Koch, 1803)  
 [= *Psylliodes obscurus* Duftschmidt, 1825]  
*Psylliodes cupreatus* (Duftschmidt, 1825)  
*Psylliodes dulcamarae* (Koch, 1803)  
*Psylliodes frivaldszkyi* Weise, 1888  
*Psylliodes glaber* (Duftschmidt, 1825)  
*Psylliodes hyoscyami* (Linnaeus, 1758)  
*Psylliodes illyricus* Leonardi & Gruev, 1993<sup>5</sup>  
*Psylliodes instabilis* Foudras, 1860  
*Psylliodes isatidis* Heikertinger, 1912  
*Psylliodes laticollis* Kutschera, 1864  
 [= *Psylliodes weberi* Lohse, 1955]  
*Psylliodes luteolus* (Müller, 1776)  
*Psylliodes napi* (Fabricius, 1792)  
*Psylliodes picinus* (Marsham, 1802)  
*Psylliodes picipes* Redtenbacher, 1849  
*Psylliodes rambouseki* Heikertinger, 1909  
 [= *Psylliodes forojulensis* Heikertinger, 1926]  
*Psylliodes sturanyi* Apfelbeck, 1906  
*Psylliodes subaeneus* Kutschera, 1867  
*Psylliodes thlaspis* Foudras, 1860  
*Psylliodes toelgi* Heikertinger, 1914  
*Psylliodes tricolor* Weise, 1888  
 [= *Psylliodes sophiae* Heikertinger, 1914]  
*Semicnema* Weise, 1888  
*Psylliodes reitteri* Weise, 1888  
*Sphaeroderma* Stephens, 1831  
*Sphaeroderma rubidum* (Gräells, 1858)  
*Sphaeroderma testaceum* (Fabricius, 1775)
- Subfamily Hispinae Gyllenhal, 1813  
*Hispa* Linnaeus, 1767  
*Hispa atra* (Linnaeus, 1767)
- Subfamily Cassidinae Gyllenhal, 1813  
 Tribe Cassidini Gyllenhal, 1813  
*Cassida* Linnaeus, 1758  
*Cassida* s. str.
- Cassida atrata* Fabricius, 1787  
*Cassida aurora* Weise, 1907  
*Cassida denticollis* Suffrian, 1844  
*Cassida ferruginea* Goeze, 1777  
 [= *Cassida thoracica* Geoffroy, 1785]  
*Cassida flaveola* Thunberg, 1794  
 [= *Cassida obsoleta* Illiger, 1798]  
*Cassida inquinata* Brullé, 1832  
 [= *Cassida plana* Charpentier, 1825]  
*Cassida lineola* Creutzer, 1799  
 [= *Cassida signata* Herbst, 1799]  
*Cassida nebulosa* Linnaeus, 1758  
*Cassida pannonica* Suffrian, 1844  
*Cassida panzeri* Weise, 1907  
*Cassida prasina* Illiger, 1798  
 [= *Cassida chloris* Suffrian, 1844]  
*Cassida rubiginosa* Müller, 1776  
*Cassida rufovirens* Suffrian, 1844  
*Cassida sanguinolenta* Müller, 1776  
*Cassida sanguinosa* Suffrian, 1844  
*Cassida seladonia* Gyllenhal, 1827  
*Cassida stigmatica* Suffrian, 1844  
*Cassida vibex* Linnaeus, 1767  
*Casidulella* Strand, 1928  
*Cassida berlinensis* Suffrian, 1844  
*Cassida nobilis* Linnaeus, 1758  
*Cassida vittata* Villers, 1789  
*Lordiconia* Reitter, 1926  
*Cassida canaliculata* Laicharting, 1781  
 [= *Cassida austriaca* Fabricius, 1792]  
*Mionycha* Weise, 1891  
*Cassida azurea* Fabricius, 1801  
 [= *Cassida lucida* Suffrian, 1844]  
*Cassida margaritacea* Schaller, 1783  
 [= *Cassida superba* Gmelin, 1787]  
*Cassida subreticulata* Suffrian, 1844  
*Mionychella* Spaeth, 1952  
*Cassida hemisphaerica* Herbst, 1799  
*Odontionycha* Weise, 1891  
*Cassida viridis* Linnaeus, 1758  
 [= *Cassida equestris* Fabricius, 1787]  
*Pseudocassida* Desbrochers Des Loges, 1891  
*Cassida murraea* Linnaeus, 1767  
*Hypocassida* Weise, 1893  
*Hypocassida subferruginea* (Schrank, 1776)  
*Pilemostoma* Desbrochers Des Loges, 1891  
*Pilemostoma fastuosa* (Schaller, 1783)

<sup>5</sup> Species recorded in Romania by Leonardi & Gruev (1992), on the base of a single male specimen collected from "Gylek", Bihor county.

*Chrysomelids species with uncertain status in the Romanian fauna  
(not included in the taxonomical list)*

This category comprises 30 species whose occurrence in Romania is questionable. According to recent bibliographic studies, their presumed occurrence was most probable based on misidentification. The species mentioned out of the present Romanian borders are also included here.

*Aphtona beckeri* Jacobson – mentioned by Marcu (1933) from Bucovina, outside the present limits of Romania.

*Batophila aerata* (Marsham) – mentioned from Sighișoara and Santa (Petri, 1912); it is an Atlanto-Mediterranean species distributed in North Africa, Spain, France, England, Italy, Greece and eastern Turkey, not known from Middle Europe and northern Balkan Peninsula; its presence in Romania is doubtful.

*Cassida deflorata* Suffrian – mentioned from Bucharest and Băneasa (Fleck, op. cit.); mainly it is a Mediterranean species, also recorded from Hungary and the basin of Volga River; the records in Romania need confirmation.

*Chrysolina americana* (Linnaeus) – West-Mediterranean species, reported also from Middle and East Europe, probably on misidentified specimens of *Chrysolina cerealis* Linnaeus; its occurrence in Romania is impossible (Warchałowski, in litt.).

*Cryptocephalus albolineatus* Suffrian – recorded in Făgăraș Mountains: (Bielz, op. cit.; Petri, op. cit.); endemic species in western part of the Alps; the occurrence of this species is impossible in Romania.

*Cryptocephalus cyanipes* Suffrian – recorded from Postăvarul Mountain (Petri, op. cit.); distributed in the Alps; its occurrence is less probable in Romanian fauna.

*Entomoscelis sacra* (Linnaeus) – species recorded from Romania, but its taxonomic status is controversial for the time being; according to Warchałowski (2003), it is a valid species, described from the Near East and absent from Europe; other authors consider this species a synonym of *Entomoscelis suturalis* Weise.

*Hypocassida meridionalis* (Suffrian) – recorded from Cernavodă (Fleck, op. cit.); distributed in northern Africa, Near East, southern France, southern Italy, Portugal, Spain, Balearic Islands and Corsica; the occurrence of this species in Romania is questionable.

*Labidostomis rugicollis* Lefèvre – mentioned from Comana (southern Romania) by Fleck (op. cit.), probably a misidentification, because it is known only from northern Iran, Turkmenia and Tadchikistan.

*Labidostomis lusitanica* Germar – recorded by Crișan & Bonea (1995) from Arcalia (Bistrița-Năsăud county); this is an Iberian species, whose occurrence in Romania is less probable.

*Labidostomis metallica* Lefèvre – mentioned by Montandon (1908) from Bârlad Valley, in the eastern part of Romania; after C. Hoinic (in MS), Montandon's identification revealed in fact the species *Labidostomis beckeri* Weise; its presence in Romania is normal because this country can be included in the general steppic range of the species (Warchałowski, 1985).

*Labidostomis taxicornis* (Fabricius) – recorded in Gilău Mountains (Marcu, 1961); its occurrence in Romania is improbable, being distributed in the western part of the Mediterranean area.

*Lachnaia pubescens* (Dufour) – mentioned from Comana and Bucharest (Fleck, op. cit.); distributed in northern Africa, southern France, Iberian Peninsula, Sardinia and Corsica; the occurrence of this species in Romania is questionable.

*Longitarsus aeruginosus* (Foudras) and *Longitarsus stragulatus* (Foudras) – mentioned from Sighișoara and Hațeg (Petri, op. cit.); both are Mediterranean species, whose occurrence is questionable in Romania.

*Longitarsus corynthius* (Reiche & Saulcy) – Mediterranean species, mentioned by Petri (op. cit.) from Sighișoara, possibly on the base of misidentified specimens of *Longitarsus fuscoaeneus* Redtenbacher (Gruev et. al., op. cit.).

*Longitarsus rectilineatus* Foudras – mentioned by Marcu (1936) from Cernăuți, outside the present territory of Romania.

*Luperus nigripes* Kiesenwetter – distributed in the Alps; questionable in Romania.

*Minota obesa* (Waltl) – mentioned in Romania by Montandon (1908) and Petri (op. cit.); distributed in Germany, Sudetes and the Alps; after recent revisions (Biondi, 1986), it is probably a misidentification of *Minota carpathica* Heikertinger or *Minota halmae* (Apfelbeck).

*Oreina bidentata* Bontems – recorded under the name *Oreina tristis* Fabricius from Cibin, Rodna, Făgăraș and Retezat Mountains (Kuthy, op. cit.; Montandon, 1906; Petri, op. cit.), possibly on the base of misidentified specimens of *Oreina coerulea* (Olivier); the true *Oreina bidentata* Bontems is distributed in the Alps, the Apennines and the Pyrenees (Warchałowski, 2003).

*Oreina elongata* Suffrian and *Oreina frigida* (Weise) – mentioned by Montandon (1906) from Broșteni, in the Moldavia region; its occurrence in Romania is not possible, these species being distributed only in the Alps and the Apennines.

*Oreina melancholica* (Heer) – mentioned under the name *Orina melanocephala* Duftschmidt in Ciuc' Mountains, Piatra Ascuțită (Bielz, op. cit.) and Hăghimașu Mare (Kuthy, op. cit.); these information probably refer to another species, *Oreina melancholica* (Heer) being distributed only in the Alps.

*Phyllotreta consobrina* (Curtis) and *Phyllotreta wiseana* Jacobson – recorded by Knechtel & Ionescu (1936) from Insula Șerpilor (Snake Island, in the Black Sea), out of the present Romanian borders.

*Phyllotreta paralella* (Boieldieu) – mentioned from Bucharest and Rucăr (Fleck, op. cit.); distributed in North-western Africa, Italy, northern France and Iberian Peninsula; questionable in Romania.

*Phyllotreta variipennis* (Boieldieu) – mentioned from Babadag (Dobroudja region) by Fleck (op. cit.); distributed in Iberian Peninsula, Canary Islands, France, Switzerland, Italy, Balkan Peninsula, Asia Minor, Israel, Iran; its presence in the Romanian fauna needs confirmation.

*Prasocuris vicina* Lucas – recorded from Cislăchioara, Cluj (Bielz, op. cit.), Hațeg, Brașov, Vâlcele (Petri, op. cit.); distributed in North-western Africa, Corsica, Sardinia, Sicily and southern Italy; questionable in Romania.

*Psylliodes schwarzi* Weise – recorded in Postăvarul, Parâng and Rodna Mountains (Petri, op. cit.); its presence in the Carpathian Basin is excluded, the species being endemic in the Alps (Kaszab, op. cit.); the above records must be based on misidentification.

*Psylliodes pyritosus* Kutschera – recorded from Hunedoara (Csiki, 1914); distributed in southern France, eastern Spain, Italy, Sardinia, Sicily and Croatia; the occurrence of this species in Romania is not possible (Gruev et. al., op. cit.).

#### ACKNOWLEDGEMENTS

The author sincerely thanks Prof. Dr. A. Warchałowski (Wrocław, Poland) for his unusually valuable and thoughtful comments and information, this way contributing to the accuracy of the manuscript. I also thank to the anonymous referees for their constructive comments and publishing advice.

#### LISTA SPECIILOR DE CHRYSOMELIDAE (COLEOPTERA) DIN ROMÂNIA

##### REZUMAT

Lucrarea prezintă lista actualizată a crisomelidelor din România care cuprinde 571 specii, aparținând la 82 genuri, din 13 subfamilii. 30 specii sunt listate și discutate separat, fiind incluse în categoria speciilor cu statut incert în fauna țării noastre.

Fauna de crisomelide a României se caracterizează prin prezența speciilor endemice: *Aphtona valachica* Heikertinger, *Chloropterus moldaviensis* Pic, *Chrysolina obenbergeri* Bechyné, *Chrysolina biharica* (Breit), *Chrysolina weisei* (Frigivaldszky), *Galeruca hunyadensis* Csiki, *Pachybrachis carpathicus* (Rey) și probabil, *Cryptocephalus motasi* Panin și *Timarchida deubeli* Ganglbauer.

Pentru reactualizarea nomenclaturii, stabilirea sinonimiilor și revizuirea încadrării speciilor în taxoni supraspecifici a fost consultată monografia “*Chrysomelidae - The leaf-beetles of Europe and the Mediterranean area*” (Warchałowski, 2003).

Lista prezentă rămâne deschisă, urmând a fi completată în viitor cu noi specii de crisomelide semnalate din România.

##### LITERATURE CITED

- BIELZ, E. A., 1887 – Catalogus Coleopterorum Transsylvanie, Siebenbürgens Käferfauna. Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften, 37: 3-90.
- BIONDI, M., 1986 – Lo status sistematico del complesso *Minota obesa*: un approccio morfologico, statistico e biogeografico (*Coleoptera*, *Chrysomelidae*, *Alticinae*). Annali Museo Civico di Storia Naturale Genova, 36: 45-64.
- BOBÂRNAC, B., O. MARCU, C. CHIMIȘLIU, 1999 – Cu privire la sistematica și ecologia coleopterofaunei din zona subcarpatică a Olteniei în ultimii 70 de ani (1928-1998). Oltenia. Studii și Comunicări Științele Naturii, Craiova, 15: 83-95. (in Romanian)
- COSMOVICI, L. C., 1900 – Contribution à l'étude de la faune entomologique de la Roumanie. Annales scientifiques de l'Université de Jassy, 1 (1): 239-255.
- CRIȘAN, AL., 1993 – Cercetări faunistice și ecologice asupra familiei Chrysomelidae (Coleoptera) în Cheile Turzii în 1992. Studia Universității Babeș-Bolyai, Biologia, 38 (1-2): 59-67. (in Romanian)
- CRIȘAN, AL., 1994 – Noi date asupra familiei Chrysomelidae (Coleoptera) în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”. Analele Științifice ale Institutului Delta Dunării, Tulcea: 159-166. (in Romanian)
- CRIȘAN, AL., 1995 a – Cercetări faunistice asupra familiei Chrysomelidae (Coleoptera) în zona maritimă a Rezervației Biosferei Delta Dunării. Analele Științifice ale Institutului Delta Dunării, Tulcea: 161-168. (in Romanian)
- CRIȘAN, AL., 1995 b – Cercetări asupra familiei Chrysomelidae (Coleoptera) în zona Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, cu referire specială la *Stylosomus tamaricis* H.-S. și *Cryptocephalus gamma* H.-S. Buletinul de Informare al Societății Lepidopterologice Române, 6 (1-2): 145-149. (in Romanian)
- CRIȘAN, AL., V. BONEA, 1995 – Cercetări faunistice asupra crisomelidelor (Coleoptera: Chrysomelidae) din zona Arcalia (jud. Bistrița-Năsăud). Buletinul de Informare al Societății Lepidopterologice Române, 6 (3-4): 305-317. (in Romanian)
- CRIȘAN, AL., L. TEODOR, 1996 – Researches on leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) in “Scărița-Belioara” Botanical Reservation. Buletinul de Informare al Societății Lepidopterologice Române, 7 (3-4): 255-260.

- CRÎȘAN, AL., V. POPA, L. TEODOR, 1998 – Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from the area “Cheile Someșului Cald - Ic Ponor”, Romania. Buletinul de Informare al Societății Lepidopterologice Române, 9 (1-2): 127-132.
- CRÎȘAN, AL., V. POPA, L. TEODOR, 1999 – Studies on the leaf-beetles fauna (Coleoptera: Chrysomelidae) in “Someșului Cald Gorges” area, Romania. Buletinul de Informare al Societății Lepidopterologice Române, 10 (1-4): 131-135.
- CSIKI, E., 1899 a – Közép Európa bogarai. Rovartani Lapok, 5 (2): 40-41. (in Hungarian)
- CSIKI, E., 1899 b – Hazánk *Orsodachne*-féléi. Rovartani Lapok, 5 (5): 92-95. (in Hungarian)
- CSIKI, E., 1899 c – Magyarország Donaciinái. Rovartani Lapok, 5 (7): 138-141. (in Hungarian)
- CSIKI, E., 1911 – A bogarak elterjedése a Kárpátokban. Rovartani Lapok, 18 (10-11): 145-157. (in Hungarian)
- CSIKI, E., 1914 – Adatok Magyarország bogárfaunájához. Rovartani Lapok, 21 (1-3): 16-26. (in Hungarian)
- CSIKI, E., 1951 – Fauna jukov Gorí Radna (Die Käferfauna des Rodnaer Gebirge). Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2 (1-3): 119-168. (in Russian)
- FLECK, E., 1905 – Die Coleopteren Rumäniens. Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest, 14: 695-729.
- FRIVALDSZKY, J., 1871 – Adatok Máramáros vármegye faunájához. Matematikai és Természettudományi Közlem, 9: 224-225. (in Hungarian)
- FRIVALDSZKY, J., 1883 – *Coleoptera nova ex Hungaria*. Természettudományi Füzetek, Budapest, 7 (1): 9-18. (in Hungarian)
- FUSS, C., 1856 a – Die Siebenbürgischen *Chrysomelen* und *Oreinen*. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 7 (2): 25-32.
- FUSS, C., 1856 b – Beiträge zur Käferfauna Siebenbürgens. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 7 (3): 35-39.
- FUSS, C., 1861 a – Beiträge zur Siebenbürgischen Käferfauna, I. Zur Gattung *Chrysomela*. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 12 (9): 151-163.
- FUSS, C., 1861 b – Beiträge zur siebenbürgischen Käferfauna, II. Zur Gattung *Phaedon*. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 12 (10): 169-171.
- FUSS, C., 1871 – Beiträge zum Verzeichniss der siebenbürgischen Käferfauna. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 21: 18-21.
- GRUEV, B., O. MERKL, 1992 – To the geographic distribution of the *Longitarsus pratensis*-group (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae). Folia Entomologica Hungarica, 52: 15-20.
- GRUEV, B., O. MERKL, K. VIG, 1993 – Geographical distribution of Alticinae (Coleoptera, Chrysomelidae) in Romania. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 85: 75-132.
- HOINIC, C., 1994 – A review of the species of *Macrolepa* Samouelle (Coleoptera: Chrysomelidae) in Romania. Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 34: 17-30.
- HOINIC, C., 1995 – *Stylosomus flavus* (Coleoptera: Chrysomelidae) a new species in Romanian fauna. Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 35: 147-152.
- HURMUZACHI, C., 1904 – Troisième Catalogue des Coléoptères récoltés par les membres de la Société des Naturalistes de Roumanie. Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest - Roumanie, 13 (1-2): 64-65.
- IENIȘTEA, M. AL., 1932 – Contribuțiuni la fauna entomologică a României. Buletinul Societății Studenților în Științe Naturale, 3: 117-124. (in Romanian)
- IENIȘTEA, M. AL., 1933 a – Contribuțiuni noi la fauna Coleoptereleor României. Buletinul Societății Studenților în Științe Naturale din București, 4: 50-62. (in Romanian)
- IENIȘTEA, M. AL., 1933 b – Beiträge zur Näheren Kenntnis der Käferfauna des Retezat Gebirges. Buletinul Muzeului Național de Istorie Naturală Chișinău, 5: 3-11.
- IENIȘTEA, M. AL., 1936 – Contribution à la connaissance des Coléoptères du Massif Godeanu (Monts Sibîșelului, Carpathes Méridionales). Annales Scientifiques de l'Université de Jassy, 22 (1-4): 379-392.
- IENIȘTEA, M. AL., 1968 – Ord. Coleoptera (pars). Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 9: 97-114.
- IENIȘTEA, M. AL., 1974 – Contributions à la connaissance des Coléoptères du Delta du Danube (Le „grind“ Caraorman). Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 14: 239-249.

- IENIȘTEA, M. AL., 1975 – Coleoptera. Pp. 193-210. *In*: Grupul de Cercetări Complexe „Porțile de Fier”, Fauna. Edit. Academiei, București. (in Romanian)
- ILIE, A. L., 2000 – Contribuții la cunoașterea subfamiliilor Donaciinae, Criocerinae, Clytrinae, Eumolpinae, Galerucinae (Coleoptera: Chrysomelidae) din Oltenia. *Buletinul de Informare al Societății Lepidopterologice Române*, 11 (1-4): 133-138. (in Romanian)
- JAQUET, M., 1898 – Faune de la Roumanie. Insectes récoltés par M. Jaquet en 1897 et déterminés par Mr. Ernest Poncey, assistant au Musée d' Histoire Naturelle de Genève. *Buletinul Societății de Științe*, 7 (1): 52-56.
- JAQUET, M., 1899 a – Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés par M. le Dr. Jaquet en 1898 et déterminés par M. E. Poncey, entomologiste à Genève. *Buletinul Societății de Științe*, 8 (1-2): 121-126.
- JAQUET, M., 1899 b – Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés par M. le Dr. Jaquet et déterminés par M. E. Poncey à Genève. *Buletinul Societății de Științe*, 8 (4-5): 370-377.
- JAQUET, M., 1900 a – Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés par Mr. le Dr. M. Jaquet et déterminés par Mr. E. Poncey à Genève. *Buletinul Societății de Științe*, 9 (4): 392-400.
- JAQUET, M., 1900 b – Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés en 1899 par M. Jaquet et déterminés par M. E. Poncey à Genève. *Buletinul Societății de Științe*, 9 (6): 754-762.
- JAQUET, M., 1901 – Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés en 1899 par Mr. le Dr. Jaquet et déterminés par Mr. E. Poncey à Genève. *Buletinul Societății de Științe*, 10 (5): 483-497.
- JAQUET, M., 1902 – Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés par Mr. le Dr. M. Jaquet et déterminés par Mr. E. Poncey à Genève. *Buletinul Societății de Științe*, 11 (4): 449-457.
- JAQUET, M., 1903 – Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés par M. Jaquet et déterminés par Mr. E. Poncey, entomologiste à Genève. *Buletinul Societății de Științe*, 12 (1-2): 88-96.
- KASZAB, Z., 1962 – Levélbogarak-Chrysomelidae. Pp. 1-416. *In*: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) IX/B, 7. Akadémiai Kiadó, Budapest. (in Hungarian)
- KNECHTEL, W. K., M. A. IONESCU, 1936 – Contribuțiuni noi la studiul faunei de pe Insula Șerpilor. *Buletinul Societății Naturaliștilor din România*, 9: 1-7. (in Romanian)
- KONNERTH-IONESCU, A., 1963 – Halticinae recorded from Romania till 1961. *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 4: 251-267.
- KUTHY, D., 1900 – Ordo Coleoptera. Pp. 1-214. *In*: A Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae). A Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest. (in Hungarian and Latin)
- LEONARDI, C., B. GRUEV, 1992 – Note sistematiche e geonemiche su alcuni *Psylliodes* del complesso *picinus* (Marsh.) con descrizione di una nuova specie (Coleoptera, Chrysomelidae). *Atti Società Italiano Scienze Naturale, Museo Civico di Storia Naturale di Milano*, 133 (2): 13-32.
- MAICAN, S., 2000 – Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from the Natural Park Piatra Craiului. *Proceedings of the Institute of Biology*, 3: 181-187.
- MAICAN, S., 2003 – Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from the Argeș river basin. *Proceedings of the Institute of Biology*, 5: 81-92.
- MAICAN, S., 2004 – Contributions to the knowledge of the Chrysomelid fauna (Coleoptera: Chrysomelidae) from Romanian Carpathians. *Acta Zoologica Universitatis Comenianae*, 46 (2): 31-39.
- MAICAN, S., R. SERAFIM, 2001 – Chrysomelidae (Coleoptera) from Maramureș. *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 43: 199-233.
- MAICAN, S., R. SERAFIM, 2004 – Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Maramureș (Romania). *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 46: 139-159.
- MANOLACHE, C. I., 1930 – Colecția Coleopteren din Laboratorul de Zoologie Descriptivă din București, donată de W. Knechtel senior. *Buletinul Societății Studenților Naturaliști, București*, 1: 3-20. (in Romanian)
- MARCU, O., 1927 – Neue Coleopteren aus der Bucovina. *Buletinul Facultății de Științe din Cernăuți*, 1: 413-423.
- MARCU, O., 1928 a – Contribuțiuni la cunoașterea Coleopteren Olteniei. *Buletinul Asociației Naturaliștilor din Oltenia*, 2-3: 1-20. (in Romanian)
- MARCU, O., 1928 b – Beiträge zur Coleopterenfauna der Bucovina. *Bulletin Scientifique de l' École Polytechnique Timișoara*: 4-11.
- MARCU, O., 1929 a – Neue Koleopterenfunde aus der Bucovina. *Buletinul Facultății de Științe din Cernăuți*, 3 (1): 160-170.
- MARCU, O., 1929 b – Contribuțiuni la cunoașterea faunei Olteniei. *Buletinul Asociației Naturaliștilor din Oltenia*, 4: 1-5. (in Romanian)

- MARCU, O., 1933 – Zoogeographische Bemerkungen über einige für die Bukowina neue oder weniger bekannte Chrysomeliden. Bukowiner Heimatblätter, Radautz, 1 (1).
- MARCU, O., 1934 – Zur Kenntnis der Coleopterenfauna von Rumänien, nebst Beschreibung einiger neuen paläarktischen Formen. Buletinul Facultății de Științe din Cernăuți, 8: 90-96.
- MARCU, O., 1935-1936 – Coleopterenfunde aus der Bucovina. Sonderabdruck aus Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt: 25-27.
- MARCU, O., 1957 – Contribuții la cunoașterea faunei Coleopterelor Transilvaniei. Buletinul Universității „Babeș-Bolyai“, Seria Științele Naturii, 1 (1-2): 527-544. (in Romanian)
- MARCU, O., 1961- Noi contribuții la cunoașterea Coleopterelor din Transilvania. Studia Universitatea „Babeș-Bolyai“, Seria Biologie, 2: 142-151. (in Romanian)
- MARCU, O., 1964 – Contribuții la cunoașterea faunei Coleopterelor din Transilvania. Studia Universitatea „Babeș-Bolyai“, Seria Biologie, 2: 75-88. (in Romanian)
- MOCSÁRY, S., 1875 – Adatok Biharmegye faunájához. Matematikai és Természettudományi Közlem, 10: 163-200.
- MOCSÁRY, S., 1876 – Biharmegye téhely-és pikkelyröpüi. Matematikai és Természettudományi Közlem, 11: 95-156.
- MONTANDON, A. L., 1879 – Brostenii et la Vallée de la Bistriza II. Feuille Jeunes Nat., Paris, 9 (102): 75-78.
- MONTANDON, A. L., 1880 a – Brostenii et la Vallée de la Bistriza IV. Feuille Jeunes Nat., Paris, 9 (117): 112-115.
- MONTANDON, A. L., 1880 b – Brostenii et la Forêt de la Bistriza V. Feuille Jeunes Nat., Paris, 10 (118): 128-130.
- MONTANDON, A. L., 1885 – Souvenirs de Moldavie. Le Domaine Royal de Broșteni. Bulletin de la Société d'Études Scientifiques d'Angers, 14: 365-390.
- MONTANDON, A. L., 1887 – Excursions en Dobroudja. Bulletin de la Société d'Études Scientifiques d'Angers (Nouvelle série), 14: 31-64.
- MONTANDON, A. L., 1906 – Notes sur la faune entomologique de la Roumanie (Coleoptera). Buletinul Societății de Științe București, 15 (1-2): 30-80.
- MONTANDON, A. L., 1908 – Notes sur la faune entomologique de la Roumanie. Additions au Catalogue des Coléoptères. Buletinul Societății de Științe București, 17 (1-2): 67-118.
- NEGRU, ȘT., 1957 – Contribuțiune la cunoașterea faunei coleopterologice a Mangaliei și împrejurimilor ei (I). Analele Universității C. I. Parhon-București, Seria Științele Naturii, 16: 117-138. (in Romanian)
- NEGRU, ȘT., 1968 – Ord. Coleoptera (pars). Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 9: 81-95.
- NEGRU, ȘT., A. ROȘCA, 1967 – Ord. Coleoptera. Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 7: 119-148.
- NISTOR, L., 2001 – A study on leaf-beetle fauna (Coleoptera: Chrysomelidae) in Vâlcele area (District of Covasna, Transylvania, Romania). Buletinul de Informare al Societății Lepidopterologice Române, 12 (1-4): 209-218.
- NISTOR, L., AL. CRIȘAN, A. RUICĂNESCU, 2000 – Data on leaf-beetle (Coleoptera : Chrysomelidae) and jewel beetle fauna (Coleoptera: Buprestoidea) of the Botanical Reserve „Fânatele Clujului“ (Cluj county, Transylvania region, Romania). Buletinul de Informare al Societății Lepidopterologice Române, 11 (1-4): 123-132.
- NITZU, E., 2001 – Edaphic and subterranean Coleoptera from the Dobrogean karstic areas (Romania). A zoogeographic approach. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut, 98: 131-169.
- PANIN, S., 1941 – Supplément à la connaissance des Coléoptères Roumains. Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, 24 (3): 178-182.
- PANIN, S., 1944 – Les *Chrysomela* de la Roumanie. Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, 26 (9): 601-625.
- PANIN, S., 1952 – Genul *Cassida* în R.P.R. Buletinul Științific, Secțiunea de Științe Biologice, Agronomice, Geologice și Geografice, 4 (3): 641-663. (in Romanian)
- PETRI, K., 1912 – Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt: 1-376.
- PETRI, K., 1925-1926 – Ergänzungen und Berichtigungen zur Käferfauna Siebenbürgens 1912. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 75-76: 1-42.
- PIC, M., 1909 – Descriptions ou diagnoses et notes diverses. L'Echange, Moulins, 25: 117-179.

- ROȘCA, A., 1973 – Contributions à la connaissance du genre *Cryptocephalus* Fourcr. (Coleoptera, Chrysomelidae) en Roumanie (I). Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 13: 143-154.
- ROȘCA, A., 1974 – Contributions à la connaissance du genre *Chrysomela* L. (Chrysomelidae, Coleoptera) en Roumanie. Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 14: 251-259.
- ROȘCA, A., 1976 – Ord. Coleoptera (pars). In: L'entomofaune du Nord de la Dobrogea, la Zone Măcin-Tulcea-Niculitel. Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 17: 145-152.
- ROZNER, I., 1996 – An updated list of the Chrysomelidae of Hungary and the adjoining parts of the Carpathian Basin (Coleoptera). Folia Entomologica Hungarica, 57: 243-260.
- ROZNER, I., 1997 – Harghita megye levélbogár-faunájának alapvetése (Coleoptera: Chrysomelidae). Acta, A Csiki Székely Múzeum es a Székely Nemzeti Múzeum Evkönyve. (in Hungarian)
- RUICĂNESCU, A., F. PATKÓ, 1995 – Studiul comunităților de coleoptere din Munții Parâng. Buletinul de Informare al Societății Lepidopterologice Române, 6 (3-4): 217-229. (in Romanian)
- SEENO, T., J. WILCOX, 1982 – Leaf-Beetle Genera (Coleoptera: Chrysomelidae). Entomography Publications, Sacramento, 1: 1-221.
- SEIDLITZ, G., 1891 – Fauna Transsylvanica. Die Kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens, 915 pp.
- SERAFIM, R., S. MAICAN, 2004 – Contributions to the knowledge of the Coleopterans from the littoral of the Black Sea (Romania). Travaux du Muséum National d' Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 47: 169-210.
- SZÉL, G., I. ROZNER, I. KOCS, 1995 – Contribuții la cunoașterea Coleoptelilor din Transilvania (România) pe baza colectărilor din ultimii ani. Acta Hargitensia II, Aluta-XIX: 73-92. (in Romanian and Hungarian)
- TĂRĂBUȚĂ, C., A. GOAGĂ, M. CIUBOTARU, B. TOMOZEI, 1999 – Catalogul speciilor de Chrysomelidae (Coleoptera, Insecta) din colecția Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău. Oltenia, Studii și Comunicări, Științele Naturii, 15: 100-110. (in Romanian)
- VIG, K., 1991 – Contribution to the knowledge of the Chrysomelidae (Coleoptera) of the Carpathian Basin. Proceedings of the 4th ECE/XIII. SIEEC, Gödöllő: 602-606.
- ZILAHÍ, K., E., 1905 – Adatok Szilágy-megye bogárfaunájához. Rovartani Lapok, 12: 172-175. (in Hungarian)
- WARCHAŁOWSKI, A., 1985 – Revision der Gattung *Labidostomis* Germar, 1824 (Coleoptera, Chrysomelidae, Clytrinae). Polskie Pismo Entomologiczne, 55: 621-765.
- WARCHAŁOWSKI, A., 1991 – Über die rot und Schwarz gefleckten Arten der Untergattung *Coptocephala* s. str. (Coleoptera: Chrysomelidae: Clytrinae). Genus, Wrocław, 2 (3): 229-279.
- WARCHAŁOWSKI, A., 1998 – Die Westpaläarktischen Arten der Gattung *Phyllobrotica* Chevrolat, 1837 (Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae). Annales Zoologici, Warszawa, 48 (1/2): 91-98.
- WARCHAŁOWSKI, A., 2003 – Chrysomelidae. The leaf-beetles of Europe and the Mediterranean area. Warszawa, 600 pp.
- WORELL, E., 1951 – Contribuții la cunoașterea faunei Coleoptelilor și Lepidopterilor din Transilvania, mai ales din împrejurimile orașului Sibiu. Buletinul Științific al Secțiunii de Științe Biologice, Agronomice, Geologice, Geografice, 3 (3): 533-543. (in Romanian)

Received: February 4, 2005  
Accepted: February 25, 2005

Institutul de Biologie al Academiei Române  
Spl. Independenței nr. 296, 060031 București, România  
e-mail: chrysomela@k.ro